

# 気管支喘息の治療薬

## ☆発作治療薬（症状が出現した時に症状をやわらげる薬）

- 去痰剤
  - アンブロキシコール塩酸塩（ムコソルバン）  
痰と気道粘膜の粘着性を低下させて痰を出しやすくします。
  - カルボシステイン（ムコダイン）  
気道の分泌物を正常な状態に調整し、気道の機能の異常も改善することで痰を出しやすくします。
- 気管支拡張剤
  - メプチン・メプチンミニ  
気管支を拡げる効果があります。
- 吸入薬
  - ベネトリン+生理食塩水・メプチンクリックヘラー  
気管支を拡げる（加湿する）効果があります。吸入間隔は最低3時間あけましょう。

---

## ☆長期管理薬（長期に使用し症状の出現を予防する薬）

- 抗アレルギー剤
  - キプレス・オノン・インタール  
アレルギー反応を抑える薬です。
- 吸入ステロイド剤
  - パルミコート・フルタイド・アドエア  
気道の炎症を抑える吸入薬です。1日2回朝夕に吸入しましょう。フルタイド吸入後は必ずうがいをしましょう。アドエアは気管支を拡げる効果もあります。

---

## ☆全身性ステロイド薬（強い症状を抑えるために短期的に使用する薬）

- 副腎皮質ホルモン剤
  - リンデロン・プレドニン  
気管支の炎症を抑える薬です。

H25.6.18



せき 小児科 クリニック  
アレルギー科  
SEKI Children's CLINIC

改訂